

ABONO INORGÁNICO COMPUESTO A BASE DE MICRONUTRIENTES CON COBRE (Cu), MANGANESO (Mn) Y ZINC (Zn)
CFP 1 (C)(II)(b)
Abono hidrosoluble

INFORMACIÓN

Wert es un fertilizante biotecnológico líquido enmarcado en la clasificación de corrector de carencias. No obstante, su composición de alto rendimiento garantiza una fácil absorción proporcionando gran movilidad por savia bruta y elaborada, permitiendo absorber y translocar el producto en períodos de reposo vegetativo. Consigue aumentar las defensas endureciendo las membranas celulares de la planta, impidiendo con ello la evolución de cualquier ataque del patógeno, especialmente de los provocados por hongos y bacterias.

- Abono CE, según Reglamento UE 2019/1009
- Producto conforme según el Reglamento europeo de agricultura orgánica (UE) 2018/848 como insumo bio
- Producto autorizado por certificadora CAEE bajo Reglamento americano NOP

CONTENIDOS GARANTIZADOS

Abono mineral a base de micronutrientes en solución:

Cobre (Cu), como sulfato, soluble en agua	4.5% p/p
Manganeso (Mn), como sulfato, soluble en agua	1.0% p/p
Zinc (Zn), como sulfato, soluble en agua	0.5% p/p

Ingredientes: sulfato de cobre pentahidratado¹ (n°CAS 7758-99-8) y ácido cítrico monohidratado¹ (n°CAS 5949-29-1).

¹CMC 1: sustancias y mezclas de materiales vírgenes

APLICACIONES / CULTIVOS

Cítricos. Frutales. (Kiwi, peral, melocotón, etc.)

Hidropónico. Hortícolas. Industriales.

Tropicales. Ornamentales.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS

APLICACIÓN FOLIAR:

Aplicación general a frutales, cítricos, vid y leñosas:

Entre 2,5-5 L/ha (250 -500 cc/hl). Entre 1 y 5 aplicaciones según cultivo y necesidades. Aplicar preferentemente en postcosecha, próximo a parada vegetativa o casi sin movimiento de savia.

Dosis calculadas para un caldo de 1000 L/Ha de forma general. El tratamiento vía foliar debe de realizarse con un déficit de presión adecuado, bajo unas condiciones de humedad y temperatura óptimas.

APLICACIÓN EN FERTIRRIGACIÓN Y AGUA DE RIEGO.

En cítricos, frutales, industriales, vid y tropicales: Repartir en 2-3 veces las siguientes dosis:

Aplicación preventiva de carencias: 5-10 L/ha.

Aplicación a los primeros síntomas: 9-12 L/ha.

Aplicaciones curativas para corregir carencias severas: 15-20 l/ha.

En hortícolas y ornamentales: Entre 5-20 L/ha. Repartir durante el ciclo.

Aplicar preferentemente al suelo en el momento de preparación del terreno vía riego, repetir en surco o cuello de la planta en los momentos de máximo desarrollo hasta finales de ciclo.

PRECAUCIONES

Antes de preparar una mezcla, se debe realizar una prueba de compatibilidad.

Evitar aplicar en las horas de máximo calor, nunca superar los 35 °C.

No mezclar o poner en contacto con productos de reacción muy alcalina, ácidos y de reacción oxidante (Caldo bordelés, azufre, hidróxido de cobre, polisulfuros, etc).

En caso de aguas dura o con pH alcalino corregir con pH 4 o pH4 Eco hasta un pH final del caldo de 5,5-6.

Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis recomendadas.

ADVERTENCIAS

No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse después de usar. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Temperatura de almacenamiento de entre 0 y 40 °C

Nota: Las dosis son orientativas, se recomienda su aplicación bajo el asesoramiento de nuestro dpto. técnico.

Pónganse en contacto con TAVÁN o con su asesor técnico para obtener recomendaciones más específicas.

USO PROFESIONAL